

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

1. Interaksi antara perlakuan pemberian pupuk NPK Grower dan POC Bonggol Pisang berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman umur 28 hst, tetapi tidak berpengaruh nyata pada parameter lainnya. Perlakuan terbaik yaitu A2P2 tidak berbeda nyata dengan perlakuan A0P2,A0P3,A1P3,A1P2, A1P1, A1P0, A2P0, A2P3 dan A2P1
2. Perlakuan pupuk NPK Grower berpengaruh nyata pada tinggi tanaman 14,28 hst, jumlah daun umur 14 hst, dan berat segar tanamanan. Tidak memberikan pengaruh nyata pada parameter lainnya.s
3. Perlakuan pupuk POC Bonggol pisang berpengaruh nyata pada tinggi tanaman umur 28 hst, jumlah daun 14 hst dan diameter batang 28 hst dan tidak berpengaruh pada perlakuan lainnya.

### 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Respon Pertumbuh dan Hasil Tanaman Selada (*Lactuca sativa* , L.) Dengan Pemberian Pupuk NPK Grower dan Pupuk Organik Cair (POC) Bonggol Pisang

1. Hasil penelitian ini yang disarankan untuk penggunaan pupuk NPK grower dengan dosis 2,25 gram/tanaman dan POC bonggol pisang dengan konsentrasi 100 ml/liter.

Untuk mendapatkan pertumbuhan selada yang lebih optimal pemberian pupuk NPK grower dilakukan sebanyak 3 kali selama pertumbuhan tanamanan.