

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan tepung ikan peperek (*Leiognathus splendens*) dan tepung daun lamtoro (*Leucaena leucocephala*) dalam ransum tidak berpengaruh nyata ($P > 0,05$) terhadap persentase karkas ayam Kampung Unggul Lokal (ULU), tetapi berpengaruh nyata ($P < 0,05$) terhadap persentase lemak abdomen. Perlakuan D (14% tepung ikan peperek dan 6% tepung daun lamtoro) menghasilkan persentase lemak abdomen terendah sebesar 0,90%, sehingga dapat dikatakan lebih baik dalam menekan penimbunan lemak abdomen dibandingkan perlakuan lainnya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan tepung ikan peperek 14% dan tepung daun lamtoro 6% dalam ransum ayam Kampung Unggul Lokal (ULU) dapat disarankan karena mampu menghasilkan persentase lemak abdomen yang lebih rendah. Selain itu, perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan tingkat penggunaan yang berbeda serta penambahan parameter pengamatan lainnya untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap mengenai pemanfaatan tepung ikan peperek dan tepung daun lamtoro dalam pakan ayam Kampung Unggul Lokal (ULU).